

ワクチンの種類	接種対象 【標準】	接種回数		接種間隔		通知時期
		初回	追加	初 回	追 加	
ロタ(ロタリックス)	生後2カ月～生後24週まで	2回		2回目：1回目から27日以上あける		生後2カ月ごろ赤ちゃん訪問時に渡しています。
ロタ(ロタテック)	生後2カ月～生後32週まで	3回		2回目：27日以上あける	3回目：2回目から27日以上あける	
Hib(ヒブ)	接種開始が 生後2カ月～6カ月の場合	3回	1回	27日以上(医師が必要と認めた場合20日) 【標準】27日～56日間隔 2・3回目を接種するときに1歳を超えた場合は、 2・3回目をしないで追加1回接種となる。	初回終了後7カ月以上あける 【標準】7カ月～13カ月あける(おおむね1年後)	
	接種開始が 生後7カ月～11カ月の場合	2回	1回			
	接種開始が 1歳～4歳の場合	1回		5歳の誕生日の前日まで		
小児用肺炎球菌	接種開始が 生後2カ月～6カ月の場合	3回	1回	27日以上の間隔(生後12カ月に至るまでに完了) 2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目をしないで追加1回接種となる。	初回終了後60日以上あけて12カ月～15カ月の前日まで	
	接種開始が 生後7カ月～11カ月の場合	2回	1回	27日以上の間隔 2回目の接種が2歳を超えた場合、追加1回接種となる。	初回終了後60日以上あけて1歳すぎに1回	
	接種開始が 1歳～1歳11カ月の場合	1回	1回	初回終了後60日以上あけて1回		
	接種開始が 2歳～4歳の場合	1回		5歳の誕生日の前日まで		
B型肝炎	生後2カ月～1歳未満	3回		2回目：1回目から27日以上あける	3回目：1回目から139日以上あける	
四種混合	生後3カ月～7歳半 【標準的な接種期間】 初回：生後3カ月～12カ月 追加：初回3回目終了後12カ月～18カ月	3回	1回	20日以上 【標準】20日～56日間隔	初回3回目終了後6カ月以上あける 【標準】12カ月～18カ月あける	
BCG	【標準的な接種期間】 生後5カ月～8カ月	1回		公費(無料)での接種は1歳の誕生日の前日まで		
水痘	1～3歳	2回		公費(無料)での接種は3歳の誕生日の前日まで 2回目は1回目から3カ月以上あける	【標準的な接種間隔】6カ月～12カ月	1歳の誕生月の前月
麻しん風しん(MR1期)	1歳～2歳	1回		公費(無料)での接種は2歳の誕生日の前日まで		
麻しん風しん(MR2期)	年長児相当 (H27年4月2日～H28年4月1日生)	1回		公費(無料)での接種は小学校入学前の3月31日まで		対象者に郵送しました
日本脳炎(1期)	3歳～7歳半	2回	1回	6～28日 間隔	初回2回目終了後6カ月後【標準的な接種間隔】12カ月後	3歳誕生月の末頃
日本脳炎(2期)	9歳～13歳未満	1回		第1期接種終了後、6日以上(5年以上が望ましい)あけて1回		ワクチンの供給状況にあわせて通知します
*特例対象 日本脳炎(1期・2期)	H13年度生～H18年度生	4回		〔1期〕初回接種：6～28日の間隔で2回 追加：初回2回目終了後6カ月以上(標準的には1年後)あけて1回 〔2期〕第1期接種終了後、6日以上(5年以上が望ましい)あけて1回(接種期限は20歳未満まで)		
二種混合	11歳～13歳未満	1回		公費(無料)での接種は13歳の誕生日の前日まで		11歳誕生月の末頃
子宮頸がん(サーバリックス)	小学6年生～高校1年生	3回		2回目：1回目から1カ月後 3回目：1回目から6カ月後		希望者
子宮頸がん(ガーダシル)	*現在、積極的勧奨を控えています	3回		2回目：1回目から2カ月後 3回目：1回目から6カ月後		

\*日本脳炎特例対象者(平成17年～21年度に積極的勧奨を控えていた時期に接種できなかった人)